庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷二十一

子部

群校官太野院吏目臣来 桂 編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中名臣王燕緒 校對官中書臣鮑之種 滕銀監生日記廷釋

皆存が 腑若脾虚冷氣與正氣 氣有餘邪冷之氣 周王朱 食不能化內經所 撰

陳橋皮湯 |欽定匹庫全書 檳榔二枚附子炮蟹去沉香到木香馬半夏湯浸七遍去消河梨草五枚煨草豆蔻五枚枳殼去鄉人参 白茯苓去黑厚朴汁生质 大樓 电超级 人名 白茯苓去黑厚朴汁生质 陽二毒傷寒 右對如麻豆大每服三錢水一益生薑三片東三枚學 治脾虚冷邪正氣相擊搏腹虚鳴兼治陰 **2**

烏頭丸 とこうることで 右除二味熬膏外搗羅為末入前膏和劑如硬入塞 破煎六分去滓熱服脾渴氣痛服之神妙傷寒併 服 去桂去粗乾薑地檳榔少青橘皮的沒草鳥頭木一两 芫花味用醋一升熬 藿香葉 紅豆蔻 治脾臟冷氣腹内虚鳴四肢多冷心腹疼痛 天雄 地製上當歸去始鳥頭地製 丁香哉三 普齊方 去成杵 去 為 肉豆 胡 桐 膏 膏木刮二 一卷

金元四四全書 橘皮煮散将海方氏 刺痛及解傷寒 湯下病已即止 少許九梧桐子大每服十五九生薑湯或米湯橘皮 石搗為粗散每服三錢七水一盏入生薑三片棗二 乾薑 桂皮 木香 陳橘皮湯浸去 到草豆蔻去放半夏湯浸七厚朴去粗皮生薑 白术西一詞梨勒校去 治脾藏冷氣不和腹內雷鳴膨 人参 甘草兴春 枳 檳 殸 椰 麸去 脹 炒瓤 枚五

益智煮散 欠己日 戶公司 便散出生 枚擘破煎六分去滓温服食前 右搗為粗散每服三錢也水一盏入生薑三片東二 枚擘破煎七分去浑食前温服 陳橋皮湯浸去甘草以各乾薑地木香 益智去皮烏藥對桂去粗天仙藤各一沙草根炒 白术 丁香西半人参一錢 治脾臟冷氣腸鳴相逐飲食無味補虚 3 治脾臟久積冷氣流動腹虚鳴两肠 普濟方 芎藭 脹

金好四月全書 訶科勒九息す 右為散每服三錢水一盏入生薑半分煎六分去滓 食前科熱 滿少思飲食 能飲食雖食不消頻嘔逆 附子 檳 桔梗一两去 椰三分 訶梨勒 去皮鄉 高良薑 一木香三分 服 治脾臟冷氣腹内虚鳴胃膈氣滞 木香一两丹参篇頭去 用皮 陳橘皮丰两 白豆兔三 微湍 沉香 浸 Hj 去 Ξ 皮分

欠回回 Likes 二十九 右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時生薑湯下 **福皮一两湯没** 厚朴甚祖此生白茯苓士!人参 草豆蔻士吃湯 治脾臟虚冷腹脹勝鳴疼痛泄寫飲食不化 訶科勒 明成赤茯苓一两吳茱萸 海临乾做 文堂上是 大豆蔻去皮乾薑製料 厚朴西西湯及红豆蔻一两花薑半两炮厚朴一两桂说三分人参 廣頭 桔梗其的去 陳一两桂心三分人参一两去 桔梗半的去 陳

厚朴上英计及全看點白术十两轮畫其两地桔梗厚朴上 治脾臟冷氣腹內虚鳴內寒外熱宿食不消學破同煎至七分去浑食前温服學破同煎至七分去浑食前温服 學朴丸 我桂去粗半夏湯沒去消木香 丰两陳看皮半两湯

麻片白茯苓ま果皮 物豆蔻生散乾薑地陳橘皮油焙土半夏湯洗土 の豆蔻生散乾薑地陳橘皮油焙土半夏湯洗土 地桂生粗 吳茱萸湯及時厚朴生粗皮生鳥頭 地 が豆蔻土 治脾臓虚冷氣攻心腹脹痛肠鳴 大三日明山山 右為末東向九梧桐子大食前生薑醋湯下十五九 九思生冷油膩右為末煉蜜和九梧桐子大每服食前粥飲下二十 前梨勒一两城白茯苓 半两 古かる

補牌散 赤茯苓散 治脾職冷氣冒膈不利腹内虚鳴少思 金分四月百十 右搗羅為散食前炒生薑鹽湯調下二錢 食 陳趙以大麥葉以各族生 乾薑也荆三核的各族香子以厚朴土粗皮生 乾薑也荆三核的谷林本村及 电视 人 根 人 格 熟日漸羸瘦 治脾臟冷氣腹内虚鳴泄寫及食氣塊憎寒 飲

欠己日日上日 白术九 分去浑食前稍熱服思生冷油膩 右為散每服三錢水一中益生薑半分棗三枚煎六枳實一髮麸炒 本香 沉香為半當歸 料两到 良薑一两木香半两人参蘆頭阿白水三两生薑二两同樓也半两 亦茯苓三钱桔梗三錢去 普濟方 白术三錢吳茱萸一錢 阿想一錢麵 檳 熟裹 髙

吳茱萸出聖 金好口屋台書 腹臟虚鳴時時疼痛 橘皮湯下 右為末煎醋浸蒸餅和丸梧桐子大每服食前生薑 呉茱萸 造店 乾薑半两焙 始白木一两人参属頭 及吳茱萸遍時執 治脾臟冷氣積滞酷心區逆宿食不消 乾湯 **訶梨勒用皮** 微浸炒七 做浸 神麹一两時陳楊皮二两 炒陳橘皮三錢湯 桂心一 煨 熟乾地黄 焙浸 白湯

越氣九 欠已日年 白馬 草豆蔻丸 右為末生薑自然汁煮麺糊九豌豆大每服二十九 右為末鍊蜜和九梧桐子大每服食前粥飲下二十 九忌生冷 酒或陳橘皮湯下不拘時 胡 樂陳橋皮湯浸去白肉豆蔻去敬菜菔子 椒炒一木香三致檳 治脾虚冷氣腹脹滿虚鳴腰腿疼重刺 治脾胃久冷氣攻心腹脹鳴腸滿痰逆惡 普癬す 都一枚 數科致二阿魏 化醋

金好口屋石量 人参散 右為散每服二錢匕用薑米飲調下空心服 右為末煉蜜九梧桐子大温酒下二十九 皮治沒去丁香各半木香 草豆蔻皮去 甘草妥判白茯苓去黑人参各一两 治脾臟冷氣腹腸虚鳴飲食不化泄泻不止 訶梨勒皮錢 枳殼去縣檳榔對各陳 乾薑 桂二两半各 訶梨勒州 取 橘 皮

太白湯 にこりる から 丁香丸 内虚鳴 右為末鍊密丸櫻桃大每服一丸生薑鹽湯嚼下 胡椒等分 附子此裂去 皮青橘皮的一两 丁香 治脾虚冷腹中雷鳴 懷香子以桂去粗陳橘皮湯浸去甘草 治脾臟冷氣心腹痛脹問胃膈不利嘔逆腹 普齊古 乾薑 地懷香子

温脾丸 治脾臟冷氣腹内虚鳴 夫牌受水穀之精化為血氣養於臟腑充於肌膚若 右為末鍊密九梧桐子大每服二十九生薑橘皮或 米飲下不拘時 右吹咀如麻豆每服三錢七水一盏入生薑二片東 一枚學破煎七分去浑温服不拘時 高良薑一两附子吃縣 乾薑 的权以后 **脾氣虚腹脹湍**

欠三日年三十 較不化洩利腸鳴則是脾氣不足之候也 京三稜鱉甲九 四肢不舉腹脇虚脹胷滿咽乾不能嗜食縱食如嘔水 氣不祭則不能與胃行其津液周養身形致體重解墮 作嘔逆日漸羸瘦兼癖瘕氣塊等疾 乾薑 炮厚朴去粗皮逐生薑到梨勒皮 京三稜地對衛甲去被獨黄者到始白术 治脾胃久冷心腹脹淌宿食不消時 轨 替濟方 吳茱萸 两

大腹木香湯 金云口屋有書 四十九温酒下 右為末煉密丸梧桐子大空心米飲下三十九加 腹脇刺痛不思飲食 草妥對人参 大腹皮出木香的一前 四没 积 散去 数 乾地黄 焙桂去 治脾氣虚弱心腹脹滿嘔痰逆胃膈 橘皮湯浸去 白茯苓去黑皮 粗櫚 卷二十 柳山木 胡 去溢 桔 香 梗以麦蘖以陳 內豆蔻去於 當 野切婚 至 不 麹 甘

欠三司事 公育 沉香丸 煎七分去滓稍熟食前服 痛嘔逆痰涎不思飲食 右捣節每服三錢七水一盏生薑三片東二枚去核 厚 青橘皮湯浸去半夏湯多十两 两炒 治脾氣虚弱中脘痞悶脇肋脹滿心腹 白茯苓止其皮乾薑丸京三稜地到各 100 西 陳橘皮一两肉桂 普濟方 去 訶梨勒如 刺

白术散 金云口唇有電 則氣滯體重四肢無力 飲 右為末煉密九梧桐子大每服二十九煎東湯下 肉豆冠去散 沉香 白术 皮去 惠出 雲藍根 丁香 訶梨勒 治脾氣不足心腹脹淌不欲飲食若食 丁香皮生桂 玄参归为 木香 用二皮炭 卷二十 西 詞梨勒 去核白豆冠 枳 麦蘇世級人参 皮去 粗 ** 人参 麝香 *两白术 赤茯苓 殼去 去

たこりはたかり 華澄茄煮散 膨脹氣刺氣痛不思飲食面黄口淡及治中酒 六分去浑不計時温服忌生冷油膩濕麵 右為散每服三錢水一中盛入生薑半分東三枚煎 華澄茄两十丁香皮及刺高良薑一两 到附子三錢 地白茯苓三錢 華澄茄 妙本香三錢枳實半两起甘草牛两及黄者 丁香三钱草豆冠三段沉香三线陳橘皮三錢 治脾臟虚弱冷氣不和心育不快腹肋 皆称か 粗

桔 金好四月百十 梗 右搗研為散再同和匀每服二錢七入生薑二片水 脇 两皂子大治脾胃 肋 丸 小蓋煎五七沸熱服一方便入木香半兩阿魏 阿 及京三稜地 脹滿飲食不下 麦煨熟去麵 另鬼業子大一塊 治脾胃冷氣腹内雷鳴冷氣入腹中脘痞悶 一粗 西古附一 梢 塊麵裏 陳橘皮 研 卷二十 两焙 桔梗奶 白湯 焙浸 占 甘草災懷香 白鹽 女口

たこりはんない 消面色姜黄四肢少力弱育神湯一名厚朴散 治脾氣虚弱腹腸膨脹與食不 右為末煉蜜丸梧桐子大每服日空心用米飲下二 厚朴去粗皮生丁香半两白木西十香半两當 乾薑物各吳茱萸就炒甘草三分在庭耳去毛橘皮沒去蕪荑 紫石英研桂 桔梗炒二防風去又禹餘根 醉淬遠志去心草

鴻牌九 治毒風在脾中流腫脹淌短氣食軟響并不服一方有陳皮忌生冷油膩濕麵粘滑等物半入生薑半分大東二枚擘破煎八分去浑食前温 右為粗搗節入净瓷器中收貯每服五錢七水一盏 畫如三桂去皮甘草及羊白茯苓去黑皮 歸切時人参為半訶梨勒 典去妆附子处教去 乾 當師二分吳茱萸二分乾薑二分大黄二分狼毒

厚朴散出聖 大三日日 八十三日 欲嘔四肢少力 葱 右搗篩蜜丸如梧子每服三九日三忌猪肉冷水生 頭丁香半两白术半两白豆冠去皮具茱萸一分厚朴一两去皮生肉桂一两當歸半两人参半两 遂 以二附子如二 華歷 的全家 桂心ニッ芳第二か川椒上が白薇一か甘 治脾氣不足心腹脹痛喜噫吞酸食則

金岁四月白書 城微黄 司科勒用皮 高良薑半两東福皮半遍沙可科勒一两炽高良薑半两東福皮半 · 地到桂心 · 中豆冠三分甘草米两次厚 門科勒三分機人参去蘆當歸 以白术三分乾

大三日戶公吉 要 少無力水穀不消或時自利白豆冤九姓惠治脾氣不足體重自淌腹脇虚脹食 前稍熱服之 右為散每服三錢水一中盗東三枚煎三分去浑食汁沒香熟 吳茱萸培乾微炒 陳橘皮白熟培 木香一两枳實做黄厚朴汁炙今香熟附子上皮脾白术一两人参属頭:肉桂上两半白豆冠土皮部科勒二两块黄耆山两沉香一两 香港方

紫桂大丸 金分四四百言 右細羅為末酒煮麵糊和九如梧桐子大每服温 右為末鎮蜜丸弹子大每服半丸至一丸嚼米飲下 下三十九空心及晚食前服是生冷油腻黏食 蛊 酒 皮去 粗 附子如士皮臍 陳香以白豆鬼仁 皮皮 治脾虚冷氣心腹脹痛胃隔滿悶腹脹鳴 丁香 木香 甘草华西 酒

次三四年在馬 異效散 1 右搗雞為細散每服二錢七入鹽少許沸湯點服空 **噫氣不通滿悶噎塞積滯不消結聚癖痕** 題做此各高良薑 *两內豆冠三枚青橘皮沒去 京三稜對沒一白术為三甘草及二麦蘇後以陳 陳橋皮沒去白草豆鬼三枚 治脾氣虚弱飲食不美心胸膨脹脇肋痞淌 N 普濟方 土

人参湯 金安巴尼台灣 及水病後氣虚未平 腸中切痛不止 右到如麻豆大每服五錢七水一盏半入生薑一 切煎八分去滓服治久患氣脹上壅心胃食物不化 香 分 赤茯苓去皮枳殼去瓤草豆冠去皮各 芍藥 治脾氣久虚福身浮腫四肢不舉腹脹滿悶 陳橋皮 白沒 焙去 半夏湯洗 焙七遍 木香 甘草 片

理中散 Caloud Little 1831 增捐 破同煎至六分食前去浑温服 右粗搗篩每服三錢七水一盏生薑三片東一枚擘 豆冠主大 乾薑地人参 白木西一甘草及到吳茱萸的此 五味子 治脾氣虚弱在酸嘔熾胃肠脹淌不思飲食 石斛去根白术 陳橘皮湯浸去 白茯苓去以皮各草 音亦か 黄耆

|多文四月全書 白术丸 治脾虚止喘悶定嘔逆進食除腹肠脹痛 右為末煮大東肉九梧桐子大母服二十九至三十九本香 甘草《白茯苓片》青橘皮为於去白日本 訶梨勒上校厚朴及好处 丁香 石各捣羅為散每服一錢入生薑湯點服食前日三 九煎栗米薑東湯下食前晚晚各一服 村檳榔州的陳榆皮的沒是厚朴上皮蓝汁草橙

益智子散班恵 草豆鬼散聖惠 とこうえ ここう 分去浮不計時稍熱服 青黄不納飲食 右為散每服三錢水一中益生薑半分東三枚煎六 草豆冠士皮陳橘皮三两 皮臉白术一两乾薑也到木香 古甘草米两炎 治脾氣虚滞心腹脹問四肢煩疼少 治脾虚氣腹脇脹淌四肢不和面色 告州な 始桂心一两附子 *两厚朴二两 ×

檳榔散型思 一金豆四屋全書 思飲食 檳榔三分白术一两草豆冠井两 訶梨勒一两村散煙息 治脾氣虚心腹脹滿不能食 此白术 槟榔瓜二紫蘇子四炒陳橋皮上的益智子上皮沉香三分赤茯苓三分积歲丰的 丁香一分人参蘆頭 厚朴薑汁及今香熟桂 服 旗 孤没黄廷

黄耆散な恵 1. 5 飲食 右為散每服三錢水一中益生薑半分棗三枚煎六 右為散不計時候清粥飲調下一錢忌生冷油膩 黄耆一两附子去皮脐 訶梨勒用皮 人参 枳實半两起 頭 白术一西五味子 * 两白茯苓一两丁香 · · · · · 陳橘皮三分浸去 治脾氣不足腹脇脹滿四肢無力少思 音齊方

 芽 更 九 |多定匹库全書 豆冠散 膨 分去浑食前稍熱服忌生冷油膩濕麺 草 脹方見本門脾胃俱虚 皮煨牌 細羅為散食前以粥飲調下一錢忌生冷油膩 夫 用 歧 豆冠去皮取 髙良薑 甘草 治脾氣虚弱腹內膨脹不思飲食 治脾虚吞醋嘔逆腹痛泄瀉不思飲食腹脇 做亦多 一两 剉 肉熟 胡 椒丰两 生薑汁 桂 災粗 バン = 令皮 分附子 热逢 訶梨勒 炮 裂两

黒散子 てこうこ 氣湯 寒多者更加炮製去皮臍附子 右粗搗篩每服三錢七水一盞煎七分去滓温服 食後多脹四肢體疼倦和順三焦消化痰飲 連皮大腹 人参 1:1:1 治脾虚腹脹止逆思食 治脾虚脏腑秘泄不常腰重頭昏舌乾眼 白茯苓 7香皮 草豆冠西 人料澤鴻 白术 哲解な 附子 訶梨勒 去核甘草炎 两 炮 裂去 半 皮 坐 如 涩

一多定匹庫全書 補 牌湯 力喜怒不常不欲見人心煩多忌咽喉閉塞面黄 六分温服 右都入瓶内以泥盖頭候乾用稻糠煎燒一日去火 今冷細研為散每服三錢水一小益入薑東少許煎 再餘糧照醋戶大麻仁研乾薑焰一大 粗捣篩每服三錢七水一盞入大棗二枚擘破煎 桑根白皮当人参好三 治脾氣不足腹脹食欲嘔口舌乾澀四肢無 甘草

分去浑不計時温服忌生冷油腻温麵打為散每服三錢水一中益生薑半分東三枚煎六人寒灌頭水丁香半雨甘草一分泉 順魚煮散 こうしいい 人参散重惠 至七分去洋空心頓服一方有黃連無人参 治脾氣虛心腹脹淌不思飲食體重無 Ŧ

一致定匹庫全書 温中散 學破同煎至七分食前温服 右搗為散每服三錢七水一盏入生薑五片東二枚 不穩及傷寒瘴症後發浮腫 陳她以草豆冠去皮 治脾虚不能飲食時發虚腫貿膈脹淌夜睡 边陳 橘皮的沒 地甘草兴西 表蘇以各陳橋皮湯 去 白术 半夏洗 Ą Ė 白

てこう シーシー 通中散を恵 疲倦再服 研令匀每服一錢抄在口內細嚼後以米飲下其雜 右搗羅散入前難蔔子末及别入白砂糖一 食宜服此方 右搗羅為散每服二錢七鹽湯點空心服如臥不穏 雜萄子抹一两 白术一分草豆冠 治脾氣虚心腹脹滿胃膈不利少思飲 餘者 者五 普母方 皮分 有 油砂 别令 爛熟 研抱 如金 青羅 取 一錢半同 沉香

||多定匹库全書 茯苓湯椒氏家 急喘淌 萄子膏入草豆蔻末一分白砂糖三分拌令匀每取 右件㕮咀每服五錢水盏半煎至七分去淖温服不 半棗大亦細嚼米飲下並不計時候服 赤茯苓去皮澤鴻 乾生薑 桑白皮州到此 治脾氣不實手足浮腫小便私澀氣 香附子去毛橘红 大腹皮

桃仁散 大已日年 台馬 薑附湯 右件為細末每服二錢煎紫蘇湯下不拘時 焦不順面目虚弱 白茯苓米两 甘草 紫蘇葉上五味木香 桃 仁及妙去 治脾虚腹脹嘔吐痰飲食不進或發寒熱 治牌弱下虚氣不升祭衛不調水道不利三 黄皮 成火大腹子 題義 恨白术 止弱 環腳腫胀坐則不安 附子我也心縮砂仁三致白薑 普海方 甘草及二味 白术 赤茯苓皮 两

飥 腑 金与口四百十 消而成府也脾主消於水穀胃為水穀之海今脾 虚内積冷氣流於大腸為傳道之腑 脾胃及大腸虚弱則 俱虚故令水殼不化清濁不分移寒入於大腸大腸 右㕮咀每服三錢水一盏半煎八分空心服屡用屡 冷則不能固斂故為泄痢也 效 脾臓虚冷泄痢 那冷之氣乘之東之食飲留滞 ニナ 化 物出馬令職 胃

たこりをとう 朴散雅惠 右為散每服三錢水一中益東三枚煎六分去浑不 痢水榖不化 附子去皮臍 厚朴盖汁没合香熟人参去薩當歸三分對整薑 三分根桂心三分木香丰两陳橘皮 4 四段去白地出白术服 半乾木瓜三少高良量半两河梨勒 治脾虚冷不思飲食腸内脹痛大腸洩 普濟方 丰二

木香九里恵 多好四月全書 計時稍熟服忌生冷油膩 右捣羅為末鍊蜜和九梧桐子大每服食前熟粥飲 面色青黄少思飲食 乾微炒縮砂去皮草豆冠三分白术一两厚朴七遍焙縮砂一两草豆冠三分白术一两厚珠荚湯木香半两附子上两炮赤石脂一两具茱萸半 整外炎香熟當歸此妙 可科勒用皮 高良薑半去粗皮金當歸三分到可科勒一两城高良薑 か陳橘皮 -治脾臟虚冷大腸泄鴻腹痛水穀不化 級两 焙浸去 一两吳茱萸半 两一浸雨

右對如麻豆每服三錢水一盏素二枚擘破煎七分一杯香湯煙息 治脾臟虚冷大肠泄痢腹内虚鳴四肢不和不思飲食 治脾臟虚冷大肠泄痢腹内虚鳴四肢本香湯煙息 治脾臟虚冷大肠泄痢腹内虚鳴四肢 欠已四年公時 食前熱服 下三十九忌生冷油膩 不

温牌湯 金发口压石量 白术散生忠 肉冷水羊肉锅生菜心 右切以水九升煮取三升分為三服忌海藻菘菜猪 四肢乏力 厚朴沒當歸 芎藭 附子地甘草沒人参好二 半夏四雨乾薑 赤石脂 白石脂 白术一的艺艺地外桂心半两人参生的厚朴 主牌氣不足水較不利腹痛食不消 治脾脏虚冷與食减少大腸洩痢腹痛 桂心系

厚朴九聖惠 てこう 前熱服 右為散每服三錢水一中盛東三枚煎六分去浑食 没香熟 皮草豆蔻去皮當歸一两對 治脾臟虚冷食即嘔逆穀食不化或多 纵焙附子去皮腌缩砂 訶梨勒用皮

多玩四厚全書 右為末鍊密丸梧桐子大每服二十九栗米飲下空 十九不計時服 右為末酒煮麺糊和丸梧桐子大每服薑棗湯下: 華撥 縮砂仁主皮 近去滑當歸 治脾臓虚冷大便滑泄及白痢臍腹多痛 髙良薑 白术 到做少桔梗一两甘草半雨 內豆蔻去放 胡椒 可科勒 地士校 桂 五皮附子炮 Ę

とこうる とよう 白术散 鷄古香散 右捣羅為散每服三錢七米飲調下 右搗研為散再同羅勺每服二錢七空心温酒調 甘草溪到木香 骨冊鍾乳粉 白术当以縮砂仁 鷄舌香一分鹿茸 是陽起石研天雄 此去白龍 治臟腑寒泄鴻不思食 治脾虚冷泄痢不止 附子皮藤木香 替好方 詞梨勒皮分三肉豆蔻三 丁香 華澄茄香 卖 梭枚

厚朴散聖忠 多好四月全世 阿勝散生忠 麺 右為散每服食前熱粥飲調下二錢忌生冷油膩濕 嬴劣或渴不思飲食 附子士皮腳 當歸一两少厚朴二两去皮美桂心半两芎藭 阿膠炒今黃 艾葉做炒乾薑也到赤石脂三分 治脾臟虚冷大腸洩痢腹内疼痛四肢 治脾臟虚冷大腸洩痢腹痛食不消化

くこうえ ニー **补散** 右為散每服食前薑東粥飲下二錢 附子去皮 對做乾薑具 厚 朴去皮附子如去 治脾虚大便滑泄肌體羸瘦不能飲食 炒全紫色用老蓝四 3 去 裂半到两炮 臍炮 香 延培乾炒去 熟度 入雨 木香 两皮脐 後碎 藥擦 肉豆蔻仁 縮砂 乾薑同艾焯三两件 **訶梨勒** 草豆蔻仁 去皮 赤石脂 戍 陳橘皮 訶梨勒 疌 當歸 皮 没湯

保安丸 多好四月全書 未效及氣刺氣痛 右為散每服二錢七食前栗米飲下 右為末再和研勺以米醋和作劑分為两團別用白 各白時館砂仁 蜀 附子 椒 皮聯當歸 者去 各半两胎 治脾臟虚冷泄痢日夜不止臍腹冷疼服藥 妙目 并 出 炒汗 刚 ø 切焙 厚 两 卷二十二 陳橘皮湯 **当去** 半薑汁 焙浸 关 去 硫 乾 黄州分 薑 **两炮** 各 呉

厚朴散 大三四年上 九陳米飲下一切風痛及宿酒食不消炒生薑鹽湯 却超入臼内杵三五百下丸如梧桐子大每服二十 下空心服如患痢米飲下 **麺半斤裹上件藥令匀如燒餅法煨令題熟為度去** 司教的地去校五味子 甘草沙的 陳橘皮厚朴在皮鳖汁沒一草豆蔻和皮乾薑地白水 治脾臓虚冷泄痢不止及酒食所傷并一切 交汤

右粗捣筋每服三錢七水一盏聚二枚擘破煎六分乾薑收瓜白术二两陳橘皮湯沒去白 你好好你一两年人参 白茯苓去黑桔梗以甘草炎纠縮砂仁皮大参湯 治脾臟虚冷泄痢不止 冷米飲下 右為散每服三錢陳米飲下酒食傷温酒下霍亂用

|香橘湯 健脾湯 くこうも 撮痛大便滑泄 鹽少許煎六分去浑温服不拘時 右判如麻豆大每服三錢七用水 訶梨勒 乾薑地陳越以吳茱萸湯洗焙乾肉豆蔻三於 ニーラ 治脾虚自膈妨悶不思飲食四肢乏力臍腹 治脾虚泄滑不止腹内虚鳴 枝十門子如去 普楽方 上 臍 陳橘皮 乾薑炒白豆蔻 中益生薑三片 兙 白 白术 歧

到好四牌全書 訶梨勒散 治脾臓泄滑不止 擘破同煎六分食前温服 分作四處用麵裹作飲子四箇每日將一个以文武 右為散用猪肝一葉去脂膜細切後入藥末两匙 右到如麻豆每服三錢七水一盏入鹽少許東一枚 訶梨勒皮 雨益智去皮甘草贝西沉香一分懷香子哦炒」庫全書 1000 丁香半の木香 白豆蔻 陳橘皮生白 縮砂仁 乾薑成各半 頭

可科勒散生恵 白术湯 October 2115 189/ 温服日三 内疼痛手足多冷面色青黄 右對如麻豆每服三錢七水一盏荆芥一穗煎七分 火煨令黄色熟空心細嚼或鹽湯米飲下 苓去黑皮乾薑地 白术 治脾臟虚冷泄痢四肢壮熱 附子炮擊去陳橘皮湯沒去人参 白茯 治脾臟虚冷大腸洩痢食不消化腹 普碎方

分定四库全書 訶梨勒九 右為末酒煮麵糊丸梧桐子大每服二十九食前栗 右為散每服食前熱粥飲調下二錢 河梨草川皮 叫 各一兩 乾薑兩去皮做炒乾薑內半具茱萸湯浸莨醬子湯洗草豆蔻 吳茱萸焙乾微炒 當歸一兩對 治脾藏虚冷腹脹泄痢米穀不消 附子去皮膝乾薑地對龍骨一 過两

烏頭丸 肉豆蔻九 **やこりま シュ** 米飲下二十九至三十九 右為末研勺水煮白類糊丸梧桐子大每服以艾湯 心腹疼痛 肉豆蔻起最 龍骨 頭 皮炮縣去 治腹中諸冷疾消食化氣止泄濕 · 研 各 二两 治脾臓虚冷泄漏痢不止四逆不思飲食 肉桂 煨 硫黄 研細乾薑生附子 物梨去 皮去 普奔方 乾薑地陳 幸二 橘 皮

白 多定四库全書 石脂丸 陳米一升為細末水調或膏直候微酸氣即煮為 豆霜 又抵乾研一日如油新瓦上薄攤去油再研 後巴豆如皂子色即止净拭冷水中浸雨日再換 右為細末先用巴豆取肉麻油內慢火煎自且及 皮去白微 九如蒙豆大每服五七九随湯使下 两入諸藥末五两同研干萬西再羅令勺 治脾臟虚冷泄痢和胃氣固大肠 ıty 👿 極 細 硬 用 水 2

大江日日上江西 内豆造九 よる 右為末酒煮麺糊九梧桐子大每服十五九加至二 飲下 十九温米飲下空心一方等分搗羅為末陳米飲 右為末和勻煮超糊九梧桐子大每服三十九空心 内豆蔻五两附子也製 白石脂出火毒細研如粉肉豆蔻起裏根今魚 治脾臟久冷滑泄不止 普香る 幸气 調

附子散 脾臓♥ 以做黄不用黄重 木香用具在脚月黄重各半雨到碎月木香用具在腿虚冷泄痢及白痢 断

Cardinal Action 神聖香黄散山本 治 以宣連一兩生薑四两一處以慢火炒令薑乾脆深 用蕪夷五兩搗末以飯丸如梧桐子大每日空心午 薑湯嚼下空心食前 尸益神駐顏 飯前各用陳米飲下三十丸增至四十九久服去三 久患脾胃氣泄不止当本 右為細末煉蜜為丸每一兩作二十丸每服一丸生 治久患脾洩 普齊方 幸五

天鷄散 治 銀灯四周全書 用猪野一對研看胡椒橘皮鹽醬椒末等捣麵似常 **脾胃氣冷與食嘔逆下亦白痢如麺糊腰臍** 用黄嶋鷄一隻治如食法以炭災之槌了以鹽醋 去薑取連搗末每服二錢空心用茶清下甚則不過 法作鼠鈍熟煮空腹喫兩碗立瘥 之又災令極熱熟乾燥空腹食之 服瘥 治脾胃氣虚腸滑下痢 卷二十 to 痛 刷]

腎為陰逆其根則找其本陰陽四時者萬物之始終 夫凡脾勞者補肺氣以益之肺旺則感於脾是以聖 春夏養陽氣秋冬養陰氣以順其根本肝心為陽脾 治 くこうえ ハルラ 飲食勞倦則傷脾脾傷則喜噫欲臥面黄舌本澀苦 用野鷄一 脾胃氣虚下痢日夜不止腸滑不下食 **色熟煮空心食之** 脾勞 隻如食法細研橘皮椒葱鹽醬調和作 普齊方 盏 肺 餜

矣 到近四庫全書 楮 直不得嚥唾皆脾勞證也法宜補益肺氣肺王則感脾 肚九聖恵 姜黄 無力骨即煩痛宿食不消心腹積聚臍下冷疼面色 稭 肚内二 方 火新 煎布 散枚 至以 ň 治脾勞臟肺冷熱不調食少羸瘦四肢 五皂 至紋 去筋 升 炭 卷二十 來淨 へ膜 後却 取洗 蔡本鱉甲 出 用 **猪童** 肚子 細小 切便 **令二** 黄两 於二 去逢 盆於 硼災中鍋

にこりにという 右為末入前猪肚煎中慢火熬令稠可丸即丸梧 **麺熟為度** 癖 木香 香熟 紫花洗去赤芍藥 胡 桔 京三稜上雨 芎藭 梗 去苗材仁雙仁麸炒微黄二兩化二三兩浸去皮尖 去蘆石斛去根當歸 神翹做炒陳橘皮沒去白 草豆蔻去皮枳殼是炒做牛膝 檳 榔 替濟方 桂心 蓬莪 肉豆蔻二两 阿魏 白术 乾漆将碎炒附子 黄耆香 麦 訶梨勒 去苗 皮薑皮 桐 梨 炮

補真丸 金好四月百書 下痢虚鳴盗汗及冷勞疾癖 朖 子大每服人参湯或温酒下三十九空心及晚食前 蓉酒浸木香 厚 小慢以 日更附汁金页了培乾 石斛一两小便酒醋各一井同煮一石斛去根慢火泣盗水脉焙乾用 陳福皮浸以浆水煮一日 耗更添之 康福皮浸厚朴皮 苍术一斤半生薑二斤 細厚朴皮 苍术净刮去黑皮二味各 治脾勞四肢無力不能飲食心腹滿脹或時 巴戟天太心 石斛士根丁香 當歸切好草豆歲去 皮浸細各 二去切凹 兩衛甲 同兩 入用 肉炎 鍋東

にこうことを 葫蘆巴九 食無味面色萎黄 右為細末將一半用熏肉丸如梧桐子大空心米飲 下二十九一半作散米飲調或煮羊肝[具用藥]兩 以鹽葱白浆水煮熟空心服之 白茯苓皮 沉香一西黄耆两三 杜仲及其補骨脂以人参 訶梨勒皮 治脾労大便不調區逆腹脹羸瘦力少飲 桂 去皮 音牌方 五味子 附子此縣柴胡 檳榔当山茱萸 夫 去苗


金好四月全書 用鹽湯下 右為末用清米醋煮麪糊丸如梧桐子大每服空心 桃仁士皮 皮牌白豆蔻大皮草梭 葫蘆巴 檳 榔 硫黄 别听澄茄 44 六剉 枚各 尖雙 析 補骨脂以肉從茶酒浸巴戟天出附 治脾勞膩腑虚冷不思飲食嘔逆四肢 六 枚仁 **刘莲莪木**根 赴 阿親我和作師子內豆蔻去 懐香子 り丁香 桂 皮去 柑 當歸 ŧρ 焙 杏 子

でこうる とち 九晚食前再服忌莧菜 少力腹脇脹痛 替悔方 走

無夷煎丸な 銀兵四月全書 白术三分厚朴三分去粗皮生肉桂三分草核三附子三分炮縮砂三分香附子三分积實三分处 橋皮一两沒去丁香牛两乳香細研白豆蔻牛两無莠仁二两捣解用酸米人参三次木香牛两康 右為末入旗夷煎和令匀更入煉了密和九梧桐子 水四肢黄瘦雖食不成肌膚大腸時時泄滑宜服 白术三分厚朴三分去粗皮 治脾勞飲食不即口苦舌尖多吐清

とこう 直 とよう 焼脾散 氣勞傷少食脹滿體無光澤真氣衰乏少力好睡 食雖多不生肌肉口瘡燥渴男子諸虛百損婦人血 大每服空心及晚食前粥飲下二十九漸加至三 肉豆蔻 地養术が良薑 芍樂 治脾劳虚冷年深泄瀉久作滑肠瘦困减食 桔梗 橘皮 縮砂仁 乾山藥 普齊方 附子皮去 紅豆)1] 极 炒白术 苗香が乾薑 **弐**

銀灰四周台書 焼熟分三四次細嚼飲下日均一劑或細切拌藥末 鋪生薑葱絲一重 捲定麻扎了濕紙數十重裹慢火 作饀法麵包角子五六箇燒熟日均一劑 亦佳 右為細末每用三錢猪肝三兩薄批作三片掺藥 麸 大大数白楼是一两半三个小童及汁令香熟二 方聖惠 治脾勞心腹氣冷痛時時下痢宜服 五味子一两 白石脂 神趙一两當歸一 縮 砂 一两 皮两 殸 梨 連



猪肝散雪 多好四月全書 生葱蕪夷桃李雀肉酢髓字恐誤并酥蜜為五物 舌生瘡四肢無力日漸羸弱宜服 九至四十九為劑日再服温清酒進之忌海藻菘菜 右搗飾五髓中微火煎攪可為丸如桐子初服三十 茵陳 眼乾桂心 聖惠 犀角屑 治脾勞虚損冷大肠滑泄不思飲食口 小胡玉两 茯苓兩四乾薑 半两 縮砂半两人参三分桔梗 石 斛 根半两去 白术 白术三分 芎藭 赤 爾 Б.

黄耆九里惠 欠日日日本 中助力 重裹以慢火煨令熟空心食後盡後與暖酒半盏 右為散用猪肝 白三莖細切入散五錢重重掺在肝上用濕紙五七 內柱三分去 刘 覆盆子一两牛膝一两鱉甲八合黄 治脾胃虚勞羸瘦脚膝疼痛宜充飢 , 葉净去筋膜不洗薄切作片子葱 防風其兩白蕪夷仁半兩內豆蔻 普牌方 · 調

石為末煉蜜九梧桐子大每服二十九空心服陳栗性沉香一两熟乾地黄二两生玩子一两人参一附子上皮懈 肉桂鱼两土五味子一两人参一附石斛山两土肉茯苓一两酒没一宿白术一两金好吃月有 思飲食肌肉羸瘦風虚五勞七傷面黃質色短力之七聖散亦所亦 治脾勞腹脹憂患不樂大便滑泄不 米飲下食後再服 治脾勞腹脹憂患不樂大便滑泄不

くこうま シビュ 鹽 黄耆二兩 香熟為度細嚼米飲下忌冷水并動風等物一方用 右為末每服三錢用猪腎一節去皮膜批作片子入 始五两崇胡西半 彰薑的二 懐香子炒白术 一錢與藥拌勻掺在猪腎內濕紙裹灰火內煨 治脾勞腹脹寒熱四肢無力肌肉消瘦不 桔梗炒紫花去苗白芷雨一蒼术去黑 替癖方 白茯苓皮 陳橋皮 罕

半夏散型忠 金丘四屆全書 飲食 飲下食後再服 右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九空心陳栗米無夷仁如看桔梗如三 如好人參 甘草是於知母好性主於木香時 際甲二兩途船災半夏一两湯沒白术一两赤茯 烏梅肉炒三常山到桃仁炒去皮 治脾勞實四肢不舉五臟脹湍氣急 桂士成本香 皮液

大いする という 生乾地黄散出聖 乾咽喉痛不能嚥睡宜服 煎六分去浑食前温服忌的糖莧菜 右粗羅為散每服四錢水一鍾入生薑半分素三枚 尚大殿皮 m 枳殼 用皮原橘皮二两浸去 治脾勞壅熱身體目唇口悉黃舌 普濟方 做黄去瓤炒 去苗杏仁火雙仁 柴胡三两 木香 两河梨勒 射干 早二

白木散聖惠 金好四月全書 爱患不樂 更煎一沸放温食後服 右為散每服四錢水一中盞煎六分去滓入蜜一 热误 白术三分白茯苓二两桂心三分厚朴 梗~嚴梔子仁一兩歲就一兩甘草心 子苓一兩茵陳 陳麹三分改草豆蔻一两大麦蘖 治脾勞胃中虚冷飲食不消腹脇脹 一两犀角一两麥門冬二两 一两 赤两 微炒 生两 淌 今汁粗 匙 枯

とこりにという 松 脂丸 · 治脾勞胃氣不和時有洩減食少無力宜 服 右為散每服食前温酒調下二錢 木香一雨二 縮砂士成人參士薩乾薑也對白茯苓一兩木香 松脂一两肉豆蔻去数詞梨勒二两根華撥 土產吳茱萸后外沒 7 檳榔 今做黄陳橘皮年两湯浸一两炒東橘皮半两湯浸 一两 普海方 黄炒陳橘皮 去 聖 瓤雨 焙浸 两

五香丸 金好四月子書 右除乳香外捣羅為末與乳香和匀煉蜜丸梧桐子 十九 右為末用白蠟鎔九梧桐子大每服食前粥飲下三 大每日空心及食後用陳米飲下二十九 乾薑炒製 木香 去教甘草炎亦厚朴去皮薑可梨勒 治脾勞虚冷腹脹腸鳴泄鴻黃水 丁香 1 鷄舌香 卷二十 乳香研沉香如肉豆蔻 芎藭一錢

大三日日 人生 人参散班惠 服 右粗捣節每服三錢七水一盏煎五分去潭食後温 前胡去屬白水到炒赤茯苓去果枳殼去 三合杏仁头炒二两 兼 旅覆花 常山 東西士白茯苓三か芎藭半雨厚朴三分生 治脾勞四肢羸痩腹中冷痛不能飲食 治脾勞效嘔 普齊方 松離西一龍膽士五竹葉 野田

丁香散生息 金好口屋看這 右為散每服四錢水一中益入生薑半分素三枚煎 六分去浑食前温服忌生冷油腻 的陳橋皮牛两沿沒訶梨勒一两次木香半个自熟枳壳做黄去熟麦蘖做的具菜萝卜的鱼等 草豆蔻三か 丁香 木香 治脾勞胃寒嘔逆臍下疼痛宜服 附子皮脐沉香布 衛甲八两全醋 桂心 白术 人參班區當歸 渓

幣甲散聖恵 C. 13 101 1117 前服尽酷物莧菜 右為散每服四錢水一中盛生薑半分煎六分去浑 右為散每服三錢水一中盏薑半分煎六分去浑食 衛甲令黃去棚人参蘆頭 赤芍藥 當歸各 西黄者到西赤茯苓半两柴胡一两五白术半两 治脾勞四肢疼痛不思飲食宜服 普牌方 五

|多定四庫全書 附子湯 苦直飲食多後乾歲惡心 右到如麻豆每服三錢七水一盏入生薑一素大切 煎七分去滓温服 食前温服 甘草及当半夏没去滑生董 福皮培的肉桂去成各白术四两具朱更没给附子收解白槟榔两·白茯苓皮煮桔梗炒到 治脾勞虛寒腹痛脹湍氣急善噫欲臥舌本 фlj 陳

アニョラ とう 白术飲出游 直不得感睡 右㕮咀每服四錢水一盏半生薑五片素一个煎七卷級聚橋皮上白木香水見麦葉如各甘草及半 喜唸多以少起情思不樂腸鳴體後 分去淖食前温服 白术 人参 草葉仁 乾薑也厚朴盛如白豆 治脚勞熱身體眼月口舌悉奏黃舌本苦 治脾勞虚冷嘔吐不食腹痛泄瀉胃滿 哲濟方 坚

金分四四分書 兩分為三服餘一服停下芒硝留晚若熱不止更進 汁更煎取四升綿採分為四服若須利泄加芒硝三 服之得利泄止後一服也忌海藻菘菜蕪美 右切以水七升先煮石膏等取二升去浑下生地黄 生地黄汁"升赤蜜 子苓酚"生玄参 栀子 治脾勞實四肢不和五臟乖戾腸淌局 石膏谷一升升麻 蔵継各四甘草 射干

厚朴散 大二可且 二十 白相雜腹內疼痛裏急後重所住頻數 息氣急不安承氣泄實熱方 右㕮咀以水一斗煮取三升分四服 半夏 宿薑私八白术 杏仁私三竹葉切 十一日兴令乾雨半 部科草核三分卜去皮以生薑汁浸可以力超聚煨去 治脾勞泄瀉日久後成毒痢或下黄膿或赤 橘皮西 大棗二十 音野か 乾薑心梨甘草 四十二 黄連 - 尖令赤 類去 芍

黄耆湯 金分四月全書 甘露飲出海 右攻阻拌匀每服三錢七水一盏煎六分去滓温服 再服之 右為散每服三錢空心陳栗米煎飲調服日午夜以 夕豆蔻去煎各 黄耆一卿大東肉一兩白石英碎木通到白石脂 西半甘草 災對蒙本去苗土 治脾氣勞傷 治脾勞實熱生體眼目悉黃舌乾咽 卷二十

前胡散 治脾勞熟有白蟲長一尺在脾為病令人時右㕮咀每服四錢水盏半薑五片煎八分去滓温服生地黄洗石斛去根甘草等分 大大幸温服 黄芩 川升麻 茵陳 梔子仁 桔梗去蘆對 大三日至 公丁 時嘔吐不出 前胡去蓝白木 細辛 旋覆花 化龍船品春仁处步收入水赤茯苓 积晨起炒被黄杏半水

煮黄丸 洋温服 袋城安在大藥袋中心用水一斗煎至一升分為三 服每日早晨服其藥除甘草不用外將餘藥焙乾搗 右除硫黄外各對入在一生網袋子盛硫黄别用小 石為粗散每服三錢水一中盛生薑半分煎六分去 甘草一雨乾薑一雨椒紅二雨 前一雨之上一雨又下二雨 附子唯一分玩黄一雨牛膝一雨到梨勒皮一雨附子性去皮 治胖股痛清泄肌肉瘦瘁困乏城食

懷香子丸 治脾勞肌膚瘦碎面色黄黑四肢無力脚 てこう シュニト 昏情嗜臥宜服 右除青鹽外搗羅為末研勺爛煮羊腎或猪肾三两 膝疼痛大便不調或風虚上攻頭眩目暗肢體沉重 羅為末硫黄别研如粉合令匀煉蜜梧桐子大每服 二十九空心陳米飲下 并牛膝酒沒一切茯蓉沒令輕青鹽 研各懷香子船上附子吃無巴戟天去心川椒 音楽す 炒及

羊肾九 |郵定四庫全書 厚朴丸 治脾勞虚冷不思飲食四肢無力嘔逆腹痛 飲下食前服 右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服二十九温 對去筋膜細切爛研和藥入曰搗令勺熟九梧桐子 大每日空心鹽湯或酒下二十九至三十九 少カ不美飲食 厚朴去皮養汁幣甲去湖一兩京三稜地裂 治脾勞臟腑滑泄夜多盗汗腹中虚鳴困倦 粥

半夏湯 **やこうぎ シェラ** 氣急不安 梧桐子大每服五十丸温酒下空心 右除艾葉外搗羅為細木入艾葉末拌勺煮棗肉九 茯苓 两次 哟 軌浸 治脾勞實熱四肢不和五臟乖戾脹淌肩息 一有木香 杏仁参二两 九上始北艾葉 肉豆蔻一两 普游方 橘皮 為細末井 芍藥和一半夏 丁香半两 五 肉茯蓉 七浸

消食膏酒一名米 麦門冬湯 金好四厚全書 不拘時 右對散每服四錢水一盏生薑七片聚二枚煎七分 右搗篩每五錢七用水盞半去浑分二 服空心温 下 通噫宿食臭 麦門冬三分 赤茯苓去黑皮芎藭一分郁李仁 研两半甘草兴赤色 治脾勞時寒時熱唇口乾焦四肢浮腫 7 治脾勞冷勞損氣脹噫湍食不下 巻二十一

三たこう シューション 茱萸根湯 右粗篩每服五錢七水一盏半煎取八分去滓温服 煎六七升温清酒一升 右搗茱萸白术等二味細細下篩為散内薑汁膏中 合藥切忌言語恐蟲聞無驗一方酒五升浸一宿微 ,媛紋去滓空心飲中盞一方用大麻子八升酒 茱萸根東引者麻子三合陳橘皮三白 猪脂二升宿薑+ 治脾勞盛好嘔欬嘔不出 普齊方 吳茱萸一升白术一升

治 二聖九 金定四厚全書 子大每服十五九食前温酒下日三服 服 消瘦面黄大腑不調非時滑泄多困少力精神不足 右研匀以清酒童子小便各一盏熬成膏丸如梧 斗浸一宿微火上薄暖之三下絞去浑平旦空服 切男子婦人脾受勞氣减食减力口無滋味 乾竭的一把二浸去皮火雙 升取盡與便下便死或爛或下黄汁 治脾勞羸瘦臍肠污痛 肌 桐 體

此方但一切患虚冷勞疾之病未有五行相傳之 而忽有此候宜服此方若患脾瘧大腑虚冷亦宜喫 藥身雖枕單之間而精神楚越矣藥餌何用哉今為 宜服此方若人患勞五職五行相傳至於脾而後求 霍香 黄橘皮 草豆卷 人参 幣甲酯及羌 水茶熟培乾川芳分 天靈盖爾及各甘草及枇杷葉去毛木香班 お存す

沉香湯 夫胃受水較其氣虚弱不能傳化則令人怠惰皆以肢 體煩重腹消善飢而不能食食已則發穀氣不行使然 金公口四百十五 也故謂之穀勞 右為細末煉蜜丸梧桐子大早朝空心米湯下三十 穀勞 治穀勞體重食已便以快氣消食

とこうえ シャラ 京三稜湯 破同煎至七分去滓温服空心日午各一服 右粗搗篩每服三錢七水一盏生薑三片棗二枚擘 京三稜城州陳越山麦蘇以木香 沉香啊判 火到白茯苓皮 半夏沿洪将切生董木香而半 白术的一厚朴立内的 陳橘皮沒去白乾薑 治穀勞體重四肢煩重食已便以 白豆蔻去皮草豆兔去皮 昔海方 檳 柳 肉豆 甘草

金定四月全書 木香湯 滓温服 右搗篩每服三錢七水一盏煎至七分不拘時候去 右搗節每服三錢七水一盏煎至八分去淖温服 俣各 意生成乾薑地甘草 杏仁没去皮蟹厚朴去 最去核婚厚朴去皮生麦蘖炒莲莪求 明各 木香 陳橘皮母白人参 陳趙的甘草或各大 治穀労身重少力多因

大江日南人 沉香湯 木香湯 右搗節每服一錢水一盏煎七分去浑服 右剉如麻豆大每服二錢七水一盏煎七分去浑服 茯苓去黑肉豆蔻去散木香两一 木香 沉香山白檀香山西乾薑地二甘草及人家 内草豆蔻牛用乾薑的 陳趙的麦蘖的各 治穀勞身重食已好以因後嗜眠 治穀勞身重食已因後嗜眠 人参 附子皮縣 甘草及白茯苓去黑 普派方

檳榔散 金切口四百十十 丁香丸 右搗篩羅為細末每服二錢以沸湯點服 右為末煉蜜丸彈子大陳米飲或生薑鹽湯嚼下 香 肉豆蔻去般地沉香到陳橘皮沒去可 檳榔半两人参 白茯苓去黑皮木香 白焙五味子 甘草质各 治穀勞嗜以四肢怠惰 治穀勞身重四肢少力食已好以昏情 詞梨勒 恨熟取皮木香 陳橘皮

分氣九 豆蔻丸 たこう車 右為末用眾水煮棗去皮爛研九如梧桐子大每 京三稜堤到蓬 白豆蔻味 勒 核煨去 X-1-1 治穀勞嗜以身體煩重 治穀勞體重食已好以 用 肉桂 胡 半皮 去皮 椒 牛雨)我茂州到青橘 當歸 普濟方 炒半新麸 阿魏 **一切** 两焙 **餅两** 误醋 各 乾麺 拍剉 破用 炒ま 耋 [6] 2 Ē 白 #Ij 半 訶 黄 梨 去两

故也 單陽為癰其證口甘久而弗治轉為消渴以熱氣上溢 長氣於陽肥甘之過令人内熱而中淌則陽氣威矣故 金好口犀有電 夫有病口甘者此五氣之溢也名曰脾癉夫食入於陰 皮湯下日三服 右為末細煮麺糊為丸梧桐子大每服二十九陳橋 牌輝 方 卷二十

大小河南 Lita 麥門冬煎 前三味再以慢火熬如稀傷以瓷合盛每服一匙湯右除前三味外搗篩以水七升煎取三升出滓次入麻酚一甘草或半石膏碎研凝水石碎研各 化不拘時 黄者 菱雞 知母 淡竹葉切犀角等看生麥門冬汁生地黄半年括菱根二两地骨皮 治脾瘅煩惧口甘咽乾煩渴 告存か

前胡湯 治脾难口甘煩渴不止 金公四月五十 在為師母服五錢七水一盏半煎一盏去潭温 右捣節每五錢七水一盏半煎一盏去淖温服去其大黄生物各栀子仁*牧淡竹葉的一柴胡二两犀角转有芍藥两半黄芩 姁 桂五次 犀角奶 服

葛根湯 大皇司事 在与 右捣飾每服三錢水一盏煎七分去浑服 煎 右搗篩每服五錢水一盞半煎七分去滓生薑三片 黄芩去黑心肉桂玉粗皮 葛根到二麻黄士根節切桂士及石膏的三芍藥 赤茯苓皮黑厚朴皮到各四两甘草及到人参 如甘草水一 治脾瘅面黄口甘煩渴不止 普齊方 半夏及七遍 弘

金以口及人口 麥門冬湯 半錢服 右搗節母服五錢七水一盏半煎一盏去滓入朴 右捣節每服二錢水一盏煎七分食後服 石膏碎三犀角纺 麥門冬出心生芍藥 赤芍藥 治脾瘅藏熱唇焦口氣引飲不止 治脾瘅發黄口甘煩渴 生乾地黄 大黄当以甘草以西 黄芩去黑心各 栀子仁红 槆

钦定四軍全書 四 蘭草湯 羚羊角丸 三和飲子 服 用蘭草一两切以水三盏煎取一盏半去浑分温三 右相合和分為五服以新水一盞調下不拘時 生薑取半 肉桠 治脾瘅口甘中滿 治脾瘅口甘内熱中淌ヶ見 汗 糯米泊研蜜一合 治脾瘅煩渴 普齊方 热本 類門 좟 脾

戊日得之於傷風為脾風之狀多汗陰動陽寒寒則 内含於脾體淫淫 則肉變色又曰至陰遇病為肌痺肌痺不已復感于 脇下痛陰引肩背不可以動轉名曰属風裏虚外實若 上色黄是其相也凡風氣藏於皮膚肉色則敗已季 則體重怠情四肢 凡肉極者主脾也脾應卤肉與脾合若脾合若脾 動傷熱熱則實實則身上如有鼠走唇口壞皮膚變 如鼠走其身津液脱腠理開大泄鼻 不欲舉不嗜飲食食則效效 則 那 夏 右 虚 病

111

をニナ

飲至四華全書 六腑五臟則半生半死扁鵲曰肉絕不療五日死何 肉濡則人中淌人中滿則唇反唇反則肉先死甲寫 知之皮膚不通外不得泄肉應太陰足太陰氣絕則 療病者風始入內皮毛肌膚筋脉之間即須决之若 色身體津液脱腠理開汗大泄名曰惡風而煩决其網 死木勝土是也若使良醫妙樂終不可療 不榮其唇口口唇者肌肉之本也脉不榮則肌肉 紀其終始陰陽動静向之虚實實則泄之虚則補之善 普濟方 脉 肌

則應腑 大黄芪湯 虚實之應主於脾若其腑臟有病從肉生熟則應臟實 〇肉虚者坐不安席身危變動肉實坐席不動喘氣肉 可轉動 痛不嗜飲食食則效效則右脇下痛陰引背及肩不 黄芪 桂心 治肉極虚體重怠惰四肢不欲舉關節疼 巴戟去心一 石斛 酒浸 澤寫

黄耆丸 治肉極虚冷寒為瘅風體重怠惰四肢不 舉關節疼痛不嗜飲食 食前服 右判為散每服四錢水二益生薑七片煎七分去 括蔓根的 三两巴戟二两桂心一两乾薑一两地澤 皮臍半夏沒七細辛去苗白术 皆存方 獨活 欲

石楠散 石為末煉蜜和丸梧桐子大每服空心食前酒下三夏一四段七細年半四白术一两 泄或不仁四肢急痛或腹緩弱唇口壞破皮膚變色 "一向芍樂一一山茱萸一 天雄 白茯苓 治肉質極肌淫淫如鼠走津液脱腠開汗大 为天雄皮醉山藥 芍藥 細辛半两白术一两 柏子仁一两 石斛 쥦

次已四年全 枸 杞湯 甘草 節疼痛飲食減少坐以不安 桃花辰砂作真珠無芍藥忌猪肉海藻菘菜一方無 右為細末每服二大錢食前温服調下一方桃仁 治肉極虚寒氣所加體重怠惰四肢不舉 黄耆到以附子典裂去皮芎藭 下没各升麻 普齊方 黄芪 华二

在吹咀每服五錢水一盏半生薑五片煎八分去津上兩防風之外半夏浴七次去 七草 生羌活班 內桂 獨 疼痛 活湯 獨活 參去益黃者到防風上益甘草及做麻黄品根 治肉極皮膚不通表實裏虚外不得泄腰膝 一两當歸兩半白茯苓去其收乾薑物烈 淖 粗去

次定日車全書 一世 半夏湯 服 w股滿留飲痰癖大便不利小腹切痛膈上有寒宜 右為散每服四錢一盏大豆半合煎五分去淖食後 服 半夏一两沒七白术一两赤茯苓一两人 大西 桂心 治肉極虚寒則脇下陰陰引背痛或動則 附子三分地陳獨皮三分 附子如梨各 普濟方 空岩之柱 虚分 欬

茯苓散 治肉極坐队不安寒氣所加體重怠惰四肢 六分去浑食前服 不舉關節疼痛飲食無味 右為散每服三錢水一中盛入生薑半分素三枚煎 遊頭 化牛膝一兩附子二两地人参去蓝當歸 白茯苓二兩黃者二兩白芍藥 三分木香三分大腹皮一两 二分去 訶梨勒-白术 石斛 用两 皮半 前胡 沉香 两

飲定四車全書 西 石 斜散 前 則脚膝緩弱並宜服 右為散每服三錢水一中盡入生薑煎六分去浑食 石斛 英西一天麻中西甘草炎做 服 去根判件膝 治肉極身體津液水泄為厲風若下焦虚極 芎藭香 獨活 防風 普濟方 古 两 各去蓝 五加 桂 15 皮 附子 白术 华三 皮炮 梨 山茱

防風散 浑食前服 右 六分去浑食前服 右為末每服三錢水一中益入生薑半分素三枚煎 附子士皮 捣羅為散每服四錢七用水酒各半益煎六分去 防 剉 五加皮 風 風去蘆 獨活 治肉極肌肉變 臍炮 甘草炎微當歸 裂 白茯苓西半人参上益 桂心 芎藭 乾薑

次包四軍全馬 石楠散 人參九 治肉極四肢急强肠肋背心下淌痛飲食不 變宜服 多手足不舉憂悉思慮宜服 右為散食前以温酒調之二錢服下 甘草华西及 桃花母料獨活 石楠半 著預 黄耆出来英西二天雄地 治肉極則身上如鼠走或與唇口拆皮膚色 薏苡仁 丹参阪一川升麻 .普濟方 李四

意於仁散 治肉實極肌膚淫淫如鼠走津液開洩或者於仁散 治肉實極肌膚淫淫如鼠走津液開洩或地吸麥門冬一两半甘草一两災地吸麥門冬一两半甘草一两災地吸麥門冬一两半甘草一两災地吸麥門冬一两半甘草一两災 金罗巴尼 台電 人参三两去 惹改仁 石膏 州芎 防已 羚羊角頭赤芍藥 杏仁去以甘草家 川根去月及附子去次鄉梨 脚 遠志出的一大 桂心不見 防 風去溢

續命湯 半 欠已日年 公島 柏時 夏湯 右攻咀每四錢水盛半薑五片煎七分去滓温服 脹淌留飲痰癖大便不利 右㕮咀每四錢水盞半薑五片煎八分去洋温服 半夏湯沒白术 子此去木香人人股皮 治向極熱膚溫溫如鼠走津液開泄汗出 治肉極虚體重脇引肩背不可動動則效 茯苓士皮人参 普濟方 甘草等分 橘皮去白 至 不 嘋 附

人參九 治肉極虚寒四肢怠惰放引脅心下湍痛手 金少世屋人 碎煎一盏去淖空心温服日晚再服 足厥冷不嗜食 右除杏仁外搗節和勺每服五錢水盈半薑一分拍 痺不仁四肢急痛 麻黄玉根節當歸到炒石膏到各桂去 芳醇半雨 黄冬去黑防風去苗 芍藥的中杏仁去皮火及 卷二十 歧 甘草

麻黄湯 2. 17. L. J. I. 黄色宜止汗通肉解風痺 開汗大泄為瘅風風氣客於皮膚肉色變變則鼻見 胸中熱藥再服 右為散煉蜜丸如彈子大每一丸含化細細嚥下覺 分無八半兩 分心培蜀山 治肉熱肌痺淫淫如鼠走身上津液脱腠 附子 极去目并用 出汗一两 替齊方 一分桂心五分甘草 遠志去心麥 产 理

多定四庫全書 弱 風湯 右如麻豆每五錢七水一盏半生薑一分碎煎 去浑空心服日午夜即再服 猫 麻黄其根枳實 啊 活 石膏碎四附子 療內極寒肌肉變舌痿名曰惡風腰脚 防風 茯苓 赵去 炒瓤 防風 裂 甘草《人参西二當歸 也白术 甘草炎山內桂 細辛

つこうし 右以水一 夏湯 切痛膈上寒 可以動動則效脾脹湍留飲瘅癖大小便不利 忌冷油物 橘皮 -之三两 白术 治肉極寒虚脾右脇下痛陰陰引肩背痛 一附子 酒三升煮取二升去滓分四服日三 桂 炮 枚大豆二升 赤茯苓 哲辉方 啊 皮熬 去 甘草 华 附子 夜

越婢湯 半夏湯 金好四库全書 氣 盏去浑温分二服 右㕮咀水九升煮三升分三服須利下芒硝三两 右搗篩每服五錢七水一盏半入生薑半分碎煎 半夏 黄 所加關格發喘 一两 治肉極實坐席安不能動作喘氣主脾病 治肉極熱身體津液脱腠理開汗大泄下焦 宿薑る八杏仁 石膏七两射干二两 Ī 五两 和 辛 橘皮西各 四 麻 執

钦定四車全書 破煎一盏去津空服日午夜以温一方有白术 痿弱 右到如麻豆每服五錢七水盏半分拍碎棗二枚劈 麻黄三分石膏三两甘草一两附子一两 1 普齊方 臍炮

4.25